

がん薬物療法治療レジメン登録票

| がん腫 | 大腸癌 | <input type="checkbox"/> 進行・再発 <input checked="" type="checkbox"/> 術後補助化学療法 <input type="checkbox"/> 術前補助化学療法 <input type="checkbox"/> その他 () | レジメン名 | FOLFIRI療法 | | |
|---|-------------------|---|-------|-----------------|------|---------------|
| 1 コース (次コースまでの日数) | | 日 | | | | |
| 投与順 | 抗がん剤名 前投薬名 | 1日投与量 ($\text{m}^2/\text{kg}/\text{body}$) | 投与経路 | 溶解液 | 投与時間 | 投与日 (d1.d8など) |
| 1 | 生理食塩液 | 50ml | | | | Day1 (ルート確保用) |
| 2 | デキサート注 グラニセトロン | 9.9mg 3mg | 点滴静注 | 生食50ml | 30分 | Day1 |
| 3 | レボホリナート点滴 | $200\text{m g}/\text{m}^2$ | 点滴静注 | 生食250ml | 2 時間 | Day1 |
| | イリノテカン点滴 | $150\text{mg}/\text{m}^2$ | 点滴静注 | 5%ブドウ糖 250ml | 90分 | Day1 |
| レボホリナート点滴とオキサリプラチン点滴は同時に投与する。 | | | | | | |
| 4 | 5-FU注 | $400\text{mg}/\text{m}^2$ | 点滴静注 | 生食100ml | 5分投与 | Day1 |
| 5 | 5-FU注注 | $2400\text{mg}/\text{m}^2$ | 点滴静注 | 生食20ml | 46時間 | Day1-3 |
| 5-FU注と生理食塩液とで全量92mlとする (イノヴァ・サーボ SV2使用)。2ml/rで投与。 | | | | | | |
| 6 | 生理食塩液 | 20ml | | | | Day1 (フラッシュ用) |
| 経口 (支持療法) | | | | | | |
| 経口 (支持療法) | | | | | | |
| 経口 (支持療法) | | | | | | |