

がん薬物療法治療レジメン登録票（申請書）

がん種	前立腺小細胞癌	☒ 進行・再発 ☐ 術後補助化学療法 ☐ 術前補助化学療法 ☐ その他（ ）		レジメン名	EP療法	
1 コース（次コースまでの日数）				28日		
投与順	抗がん剤名 前投薬名	1 日投与量 (/m ² /kg/body)	投与経路	溶解液	投与時間	投与日（d1.d8など）
1	生理食塩液	50ml	点滴静注			day1.2.3
2	パロノセトロン静注 デキサメタゾン注射液	0.75mg 9.9mg	点滴静注	生食50ml	30分	day1
3	エトポシド注	100mg/m ²	点滴静注	5%TZ500ml	2 時間	day1.2.3
4	ソリタ1号輸液 硫酸Mg注射液1mEq/ml	500ml 0.4バイアル	点滴静注		1 時間	day1
5	20%マンニトール注射液	300m l	点滴静注		1 時間	day1
6	シスプラチン点滴静注液	80mg/m ²	点滴静注	生食500ml	2 時間	day1
7	生理食塩液	500m l	点滴静注		1 時間	day1.2.3
8	ソリタT3号輸液	500m l	点滴静注		1 時間	day1.2.3
9	デキサメタゾン注射液	6.6mg	点滴静注	生食50ml	30分	day2.3
注射薬 （支持療法）						
経口 （支持療法）	アプレピタントカプセル	1日目 125mg、2.3日目 80mg	経口			
経口	デキサメタゾン錠0.5mg	4日目 16mg	経口			

投与基準	WBC : 4000/mm ³ 以上、Hb : 9.5g/dL以上、PLT : 10万/mm ³ 以上、AST : 100IU/L以下、ALT : 100IU/L以下 Scr : 1.2mg/dL以下、Ccr : 60mL/分以上 がん化学療法レジメン管理マニュアル 第3版 肺癌 EP療法より	
休薬・減量・再開の目安	☒ 有 ☐ 無	休薬 ●Grade 2 の肝機能障害が発現した場合には正常値になるまで延期 ●WBC : 3500/mm ³ 以下、Hb : 7.5g/dL以下、Scr : 1.5mg/dL以上の時は エトポシド休薬 減量 ●Grade 2 以上の腎機能障害→シスプラチン75%量へ減量 ●Grade4以上の血液毒性時→エトポシド・シスプラチンを75%量へ減量 ●Grade3以上の肝機能障害、Grade 3 以上の腎機能障害、Grade 2 以上の肺機能障害 →治療を中止 がん化学療法レジメン管理マニュアル 第3版 肺癌 EP療法より
プレ・ホストメディケーション	☒ 有 ☐ 無	アプレピタントカプセル